

Quadro 1. Demonstrativo das vacinas disponibilizadas na Campanha Nacional de Multivacinação para crianças menores de sete anos de idade, Brasil, 2017.

Vacinas	Esquema vacinal
BCG	➤ Dose única ao nascer. Disponível para crianças menores de cinco anos não vacinadas.
Hepatite B	➤ Administrar uma dose ao nascer, podendo ser administrada até um mês de idade em crianças não vacinadas.
Penta (DTP, HIB e Hepatite B)	➤ 1ª dose aos dois meses ➤ 2ª dose aos quatro meses ➤ 3ª dose aos seis meses
VIP (Vacina Intramuscular da Poliomielite)	➤ 1ª dose aos dois meses ➤ 2ª dose aos quatro meses ➤ 3ª dose aos seis meses
VOP (Vacina Oral da Poliomielite)	➤ 1º reforço aos 15 meses ➤ 2º reforço aos quatro anos
Rotavírus humano	➤ 1ª dose aos dois meses ➤ 2ª dose aos quatro meses
Pneumocócica 10 valente	➤ 1ª dose aos dois meses ➤ 2ª dose aos quatro meses ➤ Reforço aos doze meses ➤ Criança entre um e quatro anos de idade, sem comprovação vacinal, administrar uma única dose.
Meningocócica C conjugada	➤ 1ª dose aos três meses ➤ 2ª dose aos cinco meses ➤ Reforço aos doze meses ➤ Criança entre um e quatro anos de idade, sem comprovação vacinal, administrar uma única dose. ➤ Adolescentes que tenham entre 12 e 13 anos, administrar uma única dose.
Febre amarela	➤ Dose única aos nove meses.
Tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	➤ 1ª dose aos doze meses ➤ 2ª dose aos quinze meses ➤ Criança maior de 15 meses de idade ou adolescentes, sem nenhuma dose deve receber a 1ª dose e agendar a 2ª obedecendo ao intervalo mínimo de 30 dias entre elas.
DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche)	➤ 1º reforço aos 15 meses ➤ 2º reforço aos 4 anos
Hepatite A	➤ Dose única aos 15 meses ➤ Crianças de dois anos a quatro anos de idade (quatro anos 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose dessa vacina caso tenham perdido a oportunidade de serem vacinadas anteriormente.
Varicela	➤ Dose única aos 15 meses ➤ Crianças de dois anos a quatro anos de idade (quatro anos 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose dessa vacina caso tenham perdido a oportunidade de serem vacinadas anteriormente.

Quadro 2. Demonstrativo das vacinas disponibilizadas na Campanha Nacional de Multivacinação para crianças a partir dos sete anos de idade e adolescentes menores de 15 anos de idade, Brasil, 2017.

Vacinas	Esquema vacinal
Hepatite B	➤ Criança ou adolescente comprovadamente não vacinado com a vacina hepatite B ou sem comprovação vacinal: deve receber três doses da vacina hepatite B ➤ Criança ou adolescente com esquema vacinal incompleto: não necessita reiniciar o esquema, apenas completá-lo conforme situação encontrada.
Febre amarela	➤ Criança ou adolescente comprovadamente não vacinado, administrar uma dose única da vacina. ➤ Considerar vacinada pelo resto da vida
Tríplice viral	➤ Criança ou adolescente que comprovar duas doses da vacina tríplice viral deve ser considerado vacinado. ➤ Criança ou adolescente não vacinado ou com esquema incompleto, deve ser vacinado com a vacina tríplice viral conforme situação encontrada.
dT	➤ Criança a partir de sete anos de idade ou adolescente não vacinado ou sem comprovação vacinal para difteria e tétano, administrar três doses. ➤ Criança ou adolescente com esquema incompleto para difteria e tétano, completar esquema de três doses.
Meningocócica C conjugada	➤ Adolescente de 12 a 13 anos vacinado ou com esquema incompleto: administrar um reforço ➤ Adolescente de 12 a 13 anos não vacinado: administrar dose única.
HPV	➤ Sexo feminino: ➤ Nas meninas de 9 à 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) de idade, administrar duas doses. ➤ Sexo masculino ➤ Nos adolescentes de 11 à 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) de idade, administrar duas doses, com intervalo de seis meses entre elas.